

<Информация о побочных реакциях после проведения вакцинации> (러시아어)

Что нужно делать, если после вакцинации появились побочные эффекты

- Если после вакцинации у вас возникли отеки или боль на месте введения вакцины, накройте это место чистым сухим полотенцем и наложите сверху холодный компресс.
 - Если после вакцинации у вас немного повысилась температура, пейте много жидкости и постарайтесь отдыхать.
 - Если после вакцинации вас беспокоит лихорадка, мышечные боли, может помочь принятие жаропонижающих и анальгетиков.
- * Перед вакцинацией приготовьте жаропонижающие и обезболивающие средства на основе ацетаминофена. Если после вакцинации появится озноб, примите жаропонижающие и обезболивающие средства.

В каких случаях нужно обратиться за лечением к врачу.

- Если отеки, боль и покраснения в месте введения инъекции не проходят через 48 часов после вакцинации
- В случае, если в течение 4-х недель после вакцинирования появились такие симптомы как одышка, боль в груди, продолжительная боль в животе, отеки ног.
- В случае, если появилась сильная головная боль, либо наблюдается постоянная головная боль более 2-х дней после вакцинации и сопровождается отсутствием каких-либо реакций на обезболивающие, либо ухудшение зрения (появление нечеткого зрения)
- После вакцинации появилась внезапная утомляемость, либо необычные симптомы, отличающиеся от обычных предыдущих
- Если после вакцинации появились синяки или кровотечения в других местах, а не в месте введения вакцины

В каких случаях нужно звонить по номеру 119 или обратиться в отделение неотложной помощи

- В случае, если после вакцинации возникло затрудненное дыхание или сильное головокружение
- Если после вакцинации возникли отеки губ, лица или тяжелая аллергическая реакция (кожная сыпь) по всему телу
- Внезапная потеря сознания после вакцинации