

<Hướng dẫn về phản ứng khác thường sau khi tiêm phòng > (베트남어)

Những lúc thế này, hãy làm theo hướng dẫn

- Sau khi tiêm phòng trường hợp bị sưng·đau tại chỗ tiêm **hãy đặt khăn khô sạch và chườm lạnh lên trên chỗ tiêm.**
- Sau khi tiêm trường hợp sốt nhẹ hãy **nghỉ ngơi và uống nước đầy đủ.**
- Sau khi tiêm trường hợp khó chịu do sốt hoặc đau mỗi cơ bắp v.v hãy **uống thuốc hạ sốt· thuốc giảm đau sẽ giúp ích**
- Trước khi tiêm phòng hãy chuẩn bị thuốc hạ sốt·thuốc giảm đau có thành phần acetaminophen, sau khi tiêm có triệu chứng đau mỗi hãy uống thuốc hạ sốt · thuốc giảm đau

Những lúc thế này, hãy **khám bác sĩ.**

- Sau khi tiêm phòng trường hợp quá 48tiếng mà bị **sưng, đau, tấy đỏ** không khỏi
- Sau khi tiêm trong 4 tuần xuất hiện **triệu chứng như khó thở, đau ngực, đau bụng kéo dài, sưng chân.**
- Sau khi tiêm phát sinh đau đầu liên tục 2tuần hoặc bị nặng, trường hợp **không phản ứng với thuốc giảm đau hoặc không thuyên giảm, trường hợp mắt bị mờ**
- Sau khi tiêm **đột nhiên xuất hiện triệu chứng suy giảm sức lực khác thường ngày**
- Sau khi tiêm trường hợp **bị bầm tím hoặc chảy máu ở chỗ khác vị trí tiêm**

Những lúc thế này, hãy **gọi 119** hoặc đến **phòng cấp cứu**

- Sau khi tiêm trường hợp **khó thở hoặc chóng mặt nặng**
- Sau khi tiêm trường hợp xuất hiện triệu chứng **sung môi, sung mặt, dị ứng** khắp người
- Sau khi tiêm trường hợp đột ngột **bất tỉnh hoặc ngất xỉu**

<Bản dịch này do Trung tâm 1577-1366 thực hiện>