

## < 预防接种后异常反应说明 > (중국어)

这时候，请这么做。

- 接种后出现接种部位浮肿、疼痛的情况，请使用干净的干毛巾在上面冷敷。
- 接种后出现低烧时，请充分摄取水分并休息。
- 接种后因发热或肌肉疼痛等感到不便时，请服用解热、止痛药会有帮助。
- \* 接种疫苗前，提前准备好乙酰氨基酚成分的解热止痛剂，接种疫苗后如有身体不适症状，请服用解热止痛药。

这时候，请到医生那里看病。

- 接种部位浮肿、疼痛、红肿在48小时后仍没有好转的情况
- 接种后4周内出现呼吸困难、胸痛、持续腹部疼痛、腿部浮肿等症状出现的情况
- 接种后持续发生严重或2日以上的头痛、对止痛药没有反应或调节不良时或视野模糊发生情况
- 接种后突然感到乏力或与平时不同的异常症状出现情况
- 接种后非接种部位发生淤青或出血情况

这时候，请拨打119或访问急诊室。

- 接种后呼吸困难或严重眩晕情况
- 接种后嘴唇、脸部浮肿或全身出现严重皮疹情况
- 接种后突然昏迷或晕倒情况

< 由danuri呼叫中心1577-1366提供翻译 >